

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-6-63 228636

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE & LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71
C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Bulletin n° 33
Supplément N° 1

12 JUIN 1963

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

CULTURES FRUITIÈRES

Notre bulletin du 7 juin intéressait les vergers "de luxe" et les secteurs chauds notamment : département de la Seine, régions fruitières nord et ouest de Paris, Vallée de la Seine en totalité et d'une façon générale tous les vergers en situations bien exposées.

Depuis, les sorties d'adultes se sont intensifiées dans tous les secteurs. En conséquence un traitement devra être appliqué dans les secteurs froids (Plateau de Limours, Vallée de la Bièvre, région d'Evreux...) ainsi que dans les vergers traités vers le 9/6, du 18 au 20 juin inclus.

NOTE : Pour le Plateau du Neubourg, attendre un avis ultérieur.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Dans certaines cultures touchées par les orages des 7 au 11 juin, l'eau est restée stagnante entre les buttes. De plus, après l'orage du 10 juin, et malgré des quantités de pluie parfois faibles, l'humidité est restée importante pendant 15 à 20 heures par suite du temps couvert.

Dans ces conditions, surtout dans les secteurs touchés par les derniers orages, il est conseillé d'effectuer une pulvérisation soignée dès réception du présent avis.

Ne pas traiter les cultures hâtives susceptibles d'être arrachées fin juin-début juillet.

DORYPHORE : Des adultes et pontes parfois nombreux ont été observés. Surveiller les cultures et intervenir sur les jeunes larves (taille d'un grain de blé).

MOUCHE DE LA CERISE

CULTURES FRUITIÈRES

Un deuxième traitement doit être appliqué 10 jours après le premier. (Note n° 33).

GRANDES CULTURES

MELIGETHES DU COLZA : Observés dans certaines cultures de colza de printemps au stade très sensible "boutons floraux très groupés". Intervenir dès que la population est supérieure à deux insectes par hampe. Surveiller les cultures plus encore au stade rosette dès l'apparition des boutons floraux.

THRIPS DU LIN : Population variable, parfois abondante, justifiant une intervention notamment au Plateau du Neubourg où les lins commencent à fleurir. En cas de forte pullulation intervenir rapidement avec un ester phosphorique.

INFORMATIONS

RAVAGEURS DIVERS

CULTURES MARAÎCHÈRES

TEIGNE DU POIREAU : Premiers dégâts en situations chaudes. Surveiller les cultures et intervenir dès l'apparition des premiers dégâts avec : D.D.T. émulsion, Parathion éthyle, Parathion méthyle, Diazinon, Malathion.

ALTISES DES CRUCIFÈRES : Dégâts parfois importants.

MOUCHE DU CHOU : Premiers dégâts observés fin mai.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer - Montreuil (Seine)

P60